


# Алгебра, геометрия и анализ сумм степеней последовательных чисел

Г. А. Мерзон

Речь в этой статье пойдёт о вычислении суммы  $1^k + 2^k + \dots + n^k$ . Обсудив, как найти формулу для любого конкретного  $k$ , мы попробуем по нескольким первым формулам угадать, какого рода должен быть общий ответ. После этого мы увидим, как различные точки зрения на нашу задачу — аналитическая, геометрическая, алгебраическая — объясняют различные замеченные закономерности. Будет получен и явный общий ответ в терминах чисел Бернулли (вместе с рецептом вычисления этих чисел). Частично текст основан на лекциях автора в летнем лагере московской 57-й школы в 2016 году.


## § 1. НАЧАЛО

При  $k = 1$  речь идёт просто о сумме  $1 + 2 + \dots + n$ . Наиболее наглядный, видимо, способ её вычислить — геометрический: об этой сумме можно думать как о *треугольном числе*, т. е. площади «пиксельного» (составленного из единичных квадратиков) равнобедренного прямоугольного «треугольника» со стороной  $n$ . Но из двух таких треугольников легко составить прямоугольник размера  $n \times (n + 1)$ , поэтому площадь «треугольника» равна  $n(n + 1)/2$  (вдвое меньше площади прямоугольника).



Подобным образом можно вычислить и сумму  $1^2 + 2^2 + \dots + n^2$ : её можно проинтерпретировать как площадь пирамиды, основание которой —

квадрат  $n \times n$ , а высота имеет длину  $n$  и попадает в вершину основания. Из шести таких пирамид можно сложить параллелепипед  $n \times (n+1) \times (2n+1)$  (на рисунке ниже показано, как сложить половину этого параллелепипеда из трёх пирамид), поэтому искомая сумма равна  $n(n+1)(2n+1)/6$ .



Как работать с (многомерными) пирамидами в многомерном пространстве — не очень понятно (хотя мы ещё немного поговорим об этом в § 4), поэтому обратимся к алгебре.

Хорошо известно, что формулы типа

$$\begin{aligned} 1 + 2 + \dots + n &= \frac{n(n+1)}{2}; \\ 1^2 + 2^2 + \dots + n^2 &= \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}; \\ 1^3 + 2^3 + \dots + n^3 &= \frac{n^2(n+1)^2}{4} \end{aligned}$$

несложно доказать по индукции, — но не очень понятно, как подобные формулы искать.

Самое общее, что можно сказать об ответе, глядя на случаи  $k = 1, 2, 3$ , — что это многочлен от  $n$ . В действительности так будет и дальше.

**ТЕОРЕМА 1.**  $S_k(n) := 1^k + 2^k + \dots + n^k$  — многочлен от  $n$  степени  $k+1$ . Вообще, если  $p$  — многочлен степени  $k$ , то  $p(1) + p(2) + \dots + p(n)$  — многочлен от  $n$  степени  $k+1$ .

Каким должен быть многочлен  $P$ , чтобы можно было доказать индукцией по  $n$ , что  $1^k + \dots + n^k = P(n)$ ? База индукции — равенство  $P(0) = 0$ . А утверждение шага индукции состоит в том, что

$$n^k = P(n) - P(n-1) =: \Delta P(n).$$

Доказать, что такой многочлен существует, можно двумя способами.

**ДОКАЗАТЕЛЬСТВО 1.** Любой многочлен является суммой мономов, поэтому достаточно доказать первую часть теоремы.

Условие  $\Delta P(n) = n^k$  представляет собой систему уравнений на коэффициенты многочлена

$$P(n) = a_0 n^{k+1} + a_1 n^k + \dots + a_k n.$$

А именно, в выражении  $P(n) - P(n-1)$  после раскрытия скобок и приведения подобных коэффициентов при  $n^k$  должен получиться равным 1, а коэффициенты при всех остальных степенях  $n$  — равными 0.

Так как

$$n^i - (n-1)^i = in^{i-1} + \dots,$$

возникающие уравнения имеют вид (в квадратных скобках указано, коэффициенты при каких степенях  $n$  сравниваются):

$$\begin{aligned} [n^{k+1}]: & \quad 0 = 0; \\ [n^k]: & \quad 1 = (k+1)a_0; \\ [n^{k-1}]: & \quad 0 = ka_1 + (\dots) \cdot a_0; \\ [n^{k-2}]: & \quad 0 = (k-1)a_2 + (\dots) \cdot a_1 + (\dots) \cdot a_0; \\ & \dots \end{aligned}$$

Эта система имеет решение: последовательно находим коэффициенты  $a_0, a_1$  и т. д. (из уравнения с правой частью  $(k-i)a_{i+1} + \dots$  видно, как выразить  $a_{i+1}$  через уже найденные коэффициенты с меньшими номерами).  $\square$

**ДОКАЗАТЕЛЬСТВО 2.** Определённое выше  $\Delta$  — линейное отображение из  $(k+2)$ -мерного пространства многочленов степени не выше  $k+1$  в пространство многочленов степени не выше  $k$ . Его ядро одномерно ( $\Delta P = 0 \Leftrightarrow P$  — константа). Поэтому его образ имеет размерность  $(k+2) - 1 = k+1$ , а значит, совпадает со всем пространством многочленов степени не выше  $k$ .  $\square$

**УПРАЖНЕНИЕ 1.** Пользуясь теоремой 1, найдите формулу для суммы  $1^4 + 2^4 + \dots + n^4$ .

Решить это упражнение можно даже двумя способами: можно воспользоваться *утверждением* теоремы и записать, что

$$S_4(n) = an^5 + bn^4 + cn^3 + dn^2 + en,$$

а неизвестные коэффициенты найти, подставляя небольшие  $n$ ; но проще найти коэффициенты, посмотрев на первое *доказательство* теоремы.

Отметим, что хотя ответ можно записать в форме, напоминающей формулу для  $S_2(n)$ , он уже *не раскладывается на линейные множители!* Возможно поэтому формула для  $S_4(n)$  была найдена примерно на 1000 лет позже, чем формула для  $S_3(n)$ , известная уже в античности.

## § 2. ЭКСПЕРИМЕНТЫ И ГИПОТЕЗЫ

Теперь в принципе понятно, как получить ответ для любого фиксированного  $k$ . Но хотелось бы понять, как связаны ответы для разных  $k$  (а в идеале — иметь и общую формулу, работающую для произвольного  $k$ ).

Начнём с эксперимента. Выпишем уже известные нам формулы, но слегка в другой форме: так как ответ не раскладывается, вообще говоря, на линейные множители, будем записывать его просто как многочлен:

$$\begin{aligned} S_1(n) &= \frac{1}{2}n^2 + \frac{1}{2}n; \\ S_2(n) &= \frac{1}{3}n^3 + \frac{1}{2}n^2 + \frac{1}{6}n; \\ S_3(n) &= \frac{1}{4}n^4 + \frac{1}{2}n^3 + \frac{1}{4}n^2 + 0; \\ S_4(n) &= \frac{1}{5}n^5 + \frac{1}{2}n^4 + \frac{1}{3}n^3 + 0 - \frac{1}{30}n. \end{aligned}$$

Некоторые закономерности сразу бросаются в глаза.

**ГИПОТЕЗА 1.** *Старший член многочлена  $S_k(n)$  равен  $\frac{1}{k+1}n^{k+1}$ , следующий равен  $\frac{1}{2}n^k$ .*

Кроме того, появились нулевые коэффициенты. Добавим в таблицу ещё несколько первых  $k$ .

$$\begin{aligned} S_2(n) &= \frac{1}{3}n^3 + \frac{1}{2}n^2 + \frac{1}{6}n; \\ S_3(n) &= \frac{1}{4}n^4 + \frac{1}{2}n^3 + \frac{1}{4}n^2 + 0; \\ S_4(n) &= \frac{1}{5}n^5 + \frac{1}{2}n^4 + \frac{1}{3}n^3 + 0 - \frac{1}{30}n; \\ S_5(n) &= \frac{1}{6}n^6 + \frac{1}{2}n^5 + \frac{5}{12}n^4 + 0 - \frac{1}{12}n^2 + 0; \\ S_6(n) &= \frac{1}{7}n^7 + \frac{1}{2}n^6 + \frac{1}{2}n^5 + 0 - \frac{1}{6}n^3 + 0 + \frac{1}{42}n; \\ S_7(n) &= \frac{1}{8}n^8 + \frac{1}{2}n^7 + \frac{7}{12}n^6 + 0 - \frac{7}{24}n^4 + 0 + \frac{1}{12}n^2 + 0. \end{aligned}$$

**ГИПОТЕЗА 2.** *После  $\frac{1}{2}n^k$  каждый второй коэффициент (при  $n^{k-2}$ ,  $n^{k-4}$ , ...) равен нулю.*

Остальные коэффициенты выглядят довольно загадочно. Попробуем, тем не менее, разобраться. Как ведут себя коэффициенты при  $n^{k-1}$  ( $1/6$ ,  $1/4$ ,  $1/3$ ,  $5/12$ ) — сразу не видно, потому что все они записаны в виде несократимых дробей. Приведём их к общему знаменателю:  $2/12$ ,  $3/12$ ,  $4/12$ ,  $5/12$  — теперь закономерность очевидна, коэффициент равен  $k/12$ .

Дальше идёт коэффициент при  $n^{k-3}$ . После приведения к общему знаменателю получается последовательность  $-4/120, -10/120, -20/120, -35/120$ .

УПРАЖНЕНИЕ 2. а) Угадайте формулу для коэффициента при  $n^{k-3}$  (если не получается, попробуйте найти числители 4, 10, 20, 35 ... в треугольнике Паскаля).

б) Придумайте формулу для коэффициента при  $n^{k-5}$ .

Если решить это упражнение, то станет ясно, какого рода должен быть ответ: коэффициент при  $n^{k-i}$  является, видимо, многочленом от  $k$ , и даже понятно, каким именно — но... только с точностью до мультипликативной константы. Эти константы ( $1/12, -1/120, 1/1252, \dots$ ) непосредственно связаны с *числами Бернулли* — но о них мы поговорим чуть позже.

УПРАЖНЕНИЕ 3. Докажите, что

$$S_k(n) = \frac{1}{k+1}n^{k+1} + \frac{1}{2}n^k + \frac{k}{12}n^{k-1} + \dots$$

(где многоточие заменяет члены меньшей степени по  $n$ ).

Читатель, желающий как можно быстрее узнать доказательства гипотез и общий ответ, может пропустить следующие два параграфа (дальше их материал не используется).


### § 3. СУММЫ И ИНТЕГРАЛЫ

Старший член многочлена  $S_k(x)$ ,  $\frac{1}{k+1}x^{k+1}$ , должен вызывать немедленную ассоциацию: это как раз первообразная (интеграл) функции  $x^k$ , которую мы суммируем по целым точкам. Эту связь с интегрированием нетрудно и объяснить: коэффициент при старшем члене в многочлене  $S_k(n)$  — это предел выражения

$$\frac{S_k(n)}{n^{k+1}} = \frac{1^k + 2^k + \dots + n^k}{n^{k+1}} = \frac{1}{n} \cdot \left( \left(\frac{1}{n}\right)^k + \left(\frac{2}{n}\right)^k + \dots + \left(\frac{n}{n}\right)^k \right),$$

т. е. предел интегральных сумм для интеграла  $\int_0^1 x^k dx$ .

На самом деле, используя подобные соображения, можно найти и следующий член,  $\frac{1}{2}x^k$ . Обычная интегральная сумма возникает, если приблизить площадь под графиком функции  $f(x)$  суммой площадей прямоугольников со сторонами  $1/n$  и  $f(i/n)$ . Но ясно, что точность приближения повысится, если заменить прямоугольники прямоугольными трапециями (как на рисунке ниже).



Для функции  $x^n$  это соответствует переходу от оценки

$$\int_0^1 x^k dx \approx \frac{1}{n} \cdot \left( \left( \frac{1}{n} \right)^k + \left( \frac{2}{n} \right)^k + \dots + \left( \frac{n}{n} \right)^k \right)$$

к оценке

$$\begin{aligned} \int_0^1 x^k dx &\approx \frac{1}{n} \cdot \left( \frac{(0/n)^k + (1/n)^k}{2} + \frac{(1/n)^k + (2/n)^k}{2} + \dots + \frac{((n-1)/n)^k + (n/n)^k}{2} \right) = \\ &= \frac{1}{n} \cdot \left( \left( \frac{1}{n} \right)^k + \left( \frac{2}{n} \right)^k + \dots + \left( \frac{n}{n} \right)^k - \frac{1}{2} \left( \frac{n}{n} \right)^k \right), \end{aligned}$$

откуда

$$\frac{1}{k+1} \approx \frac{S_k(n)}{n^{k+1}} - \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{n}.$$

Величину ошибки, которая возникает при таком приближении, можно оценить.

УПРАЖНЕНИЕ 4. а) Докажите *формулу трапеций*: если функция  $f$  бесконечно дифференцируема на отрезке  $[a; b]$ , то

$$\int_a^b f(x) dx = (b-a) \frac{f(a) + f(b)}{2} - \frac{1}{12} f''(\xi) (b-a)^3$$

для некоторой точки  $\xi \in [a; b]$ .

б) При помощи формулы трапеций и соображений, приведённых выше, докажите, что

$$S_k(n) = \frac{1}{k+1} n^{k+1} + \frac{1}{2} n^k + o(n^k).$$

На самом деле существует последовательность *квадратурных формул*, приближающих интегралы, которые дают всё более точные приближения для  $S_k(n)$ , — причём возникающие утверждения верны и для нецелых  $k$ .

Проиллюстрируем полезность формулы трапеций (и других квадратурных формул) ещё на одном примере.


УПРАЖНЕНИЕ 5. Докажите слабую форму формулы Стирлинга:

$$n! \sim C\sqrt{n}\left(\frac{n}{e}\right)^n.$$



Её надо понимать в том смысле, что отношение левой и правой частей стремится к 1 для некоторой константы  $C$ . (*Указание*: примените формулу трапеций к интегралу функции  $\ln x$ .)

#### § 4. ЦЕЛЫЕ ТОЧКИ В МНОГОМЕРНЫХ МНОГОГРАННИКАХ

Сказанное выше можно изложить и без интегралов, на геометрическом языке. Посмотрим, например, на сумму  $S_2(n+1)$ . Она выражает число целых точек в пирамиде с вершиной в точке  $(0, 0, n)$  и квадратным основанием с вершинами в точках  $(0, 0, 0)$ ,  $(n, 0, 0)$ ,  $(0, n, 0)$ ,  $(n, n, 0)$ . Действительно, в плоскости  $z = n - i$  лежит как раз  $(i+1)^2$  целых точек этой пирамиды.



При больших  $n$  количество целых точек примерно равно объёму этой пирамиды. Но из трёх таких пирамид нетрудно сложить куб с ребром  $n$ : выберем одну вершину куба и соединим её с каждой из трёх не содержащих её граней. Поэтому объём одной пирамиды равен  $\frac{1}{3}n^3$ , а значит,  $S_2(n+1) \approx \frac{1}{3}n^3$ .



Аналогично  $S_k(n+1)$  есть количество целых точек в  $(k+1)$ -мерной пирамиде высоты  $n$  с основанием в виде  $k$ -мерного куба со стороной  $n$

(и высотой, попадающей в одну из вершин основания). Куб с ребром  $n$  разбивается на  $k + 1$  такую пирамиду: весь куб задаётся неравенствами  $0 \leq x_i \leq n$ , а  $j$ -я часть состоит из точек, для которых  $\max\{x_1, \dots, x_n\} = x_j$ . Поэтому объём одной пирамиды (являющийся первым приближением для  $S_k(n + 1)$ ) равен  $\frac{1}{k+1}n^{k+1}$ .

(Разумеется, объём нашей пирамиды можно записать как интеграл функции  $x^k$ . А предыдущее рассуждение позволяет вычислить этот интеграл геометрически, не используя формулу Ньютона — Лейбница.)

Для данного  $k$  при всех  $n$  интересующие нас пирамиды получаются растяжением эталонной пирамиды с ребром 1 в  $n$  раз по всем измерениям. О том, как при гомотетии меняется количество целых точек внутри многогранника, говорит *теория Эрхарта*.

**ТЕОРЕМА 2.** (1) Пусть  $P$  — некоторый  $k$ -мерный многогранник с вершинами в целых точках. Тогда количество  $N(nP)$  целых точек внутри многогранника  $P$ , растянутого в  $n$  раз, зависит от  $n$  как многочлен степени  $k$  («многочлен Эрхарта»), причём старший коэффициент многочлена  $N(nP)$  равен объёму многогранника  $P$ .

(2) Кроме того, имеет место взаимность Эрхарта — Макдональда:

$$N(-nP) = (-1)^k I(nP),$$

где  $I(\dots)$  — количество целых точек строго внутри многогранника.

Вероятно, вторая половина теоремы требует комментария. Мы определяем  $N(nP)$  как количество целых точек в некотором многограннике только для целых положительных  $n$ . Но раз это многочлен от  $n$ , можно формально подставлять в него и отрицательные аргументы. Смысл получающихся значений и объясняет вторая часть теоремы.

**УПРАЖНЕНИЕ 6.** Выведите из теоремы *формулу Пика*: площадь многоугольника на клетчатой бумаге с вершинами в узлах сетки равна  $i + \frac{b}{2} - 1$ , где  $i$  — число вершин строго внутри многоугольника, а  $b$  — на его границе.

Теорему 2 можно рассматривать как многомерный аналог формулы Пика. О формуле Пика можно прочитать в популярной статье [3]; из неё же можно узнать, как доказать первую часть теоремы 2 для многоугольников и трёхмерных многогранников. Здесь доказывать эту теорему мы не будем. Вместо этого применим её к нашей  $(k + 1)$ -мерной пирамиде.

Целые точки внутри этой пирамиды суть целые точки в пирамиде такого же вида, но меньшего размера: действительно, целые точки строго внутри квадрата со стороной  $n$  суть целые точки в квадрате со стороной  $n - 2$ , а кроме того, основание внутренней пирамиды находится «на этаж выше»

основания внешней пирамиды. Следовательно,  $I((n+1)P) = N((n-2)P)$ . Напомним ещё, что  $S_k(m) = N((m-1)P)$ . Поэтому взаимность Эрхарта — Макдональда даёт связь между значениями многочлена  $S_k$  в отрицательных и неотрицательных целых числах:

$$\begin{aligned} S_k(-n) &= N((-n-1)P) = (-1)^{k+1}I((n+1)P) = \\ &= (-1)^{k+1}N((n-2)P) = (-1)^{k+1}S_k(n-1). \end{aligned}$$

На самом деле получившееся равенство  $S_k(-n) = (-1)^{k+1}S_k(n-1)$  несложно доказать чисто алгебраически. Об этом пойдёт речь в следующем параграфе.

**УПРАЖНЕНИЕ 7.** Из соотношения  $S_k(-n) = (-1)^{k+1}S_k(n-1)$  выведите, что в многочлене  $S_k(n)$  после коэффициента  $1/2$  при  $n^k$  каждый второй коэффициент равен 0.

В качестве последней иллюстрации теории Эрхарта (уже не связанной непосредственно с суммированием степеней) рассмотрим  $k$ -мерный *симплекс*  $0 \leq x_1 \leq x_2 \leq \dots \leq x_k \leq 1$  (для  $k=2$  это треугольник, для  $k=3$  — тетраэдр).

По теореме 2 функция  $I((n+1)P)$  является многочленом от  $n$ . Этот многочлен читателю отлично известен: целые точки строго внутри многогранника суть наборы целых чисел, удовлетворяющие условию  $0 < x_1 < x_2 < \dots < x_k < n+1$ , т. е.  $k$ -элементные подмножества  $n$ -элементного множества. Таким образом,

$$I((n+1)P) = \binom{n}{k} = \frac{n(n-1)\dots(n-k+1)}{k!}.$$

Посмотрим теперь на многочлен  $N((n-1)P)$ . Его значение даёт количество наборов целых чисел с условием  $0 \leq x_1 \leq x_2 \leq \dots \leq x_k \leq n-1$ , т. е. количество  $k$ -элементных подмножеств с повторениями в  $n$ -элементном множестве. А в силу взаимности Эрхарта

$$\begin{aligned} N((n-1)P) &= (-1)^k I((1-n)P) = \\ &= (-1)^k \binom{-n}{k} = \frac{n(n+1)\dots(n+k-1)}{k!} = \binom{n+k-1}{k}. \end{aligned}$$

Разумеется, количество подмножеств с повторениями можно найти и при помощи несложных комбинаторных соображений, но теория Эрхарта даёт общий взгляд на разные утверждения такого рода.

Тем, кого эта теория заинтересовала, рекомендуем книгу [5] (в частности, в ней можно найти доказательство теоремы 2).

## § 5. КОММУТИРУЮЩИЕ ОПЕРАТОРЫ

Вернёмся на шаг назад. Мы выяснили, что если продифференцировать старший член многочлена  $S_k(x)$ , то получится функция, которую мы суммируем, т. е.  $x^k$ . А что будет, если продифференцировать остальные члены?

Посмотрим на два следующих члена:

$$\left(\frac{1}{2}x^k\right)' = k\frac{1}{2}x^{k-1}, \quad \left(k\frac{1}{12}x^{k-1}\right)' = k(k-1)\frac{1}{12}x^{k-2}.$$

В обоих случаях получается соответствующий член для многочлена  $S_{k-1}(x)$ , только умноженный на  $k$ . То же, кстати, можно сказать и про старший член.

**ГИПОТЕЗА 3.** *Производная многочлена  $S_k$  равна многочлену  $kS_{k-1}$ .*

Внимательный читатель заметил уже, вероятно, что буквально такая гипотеза верна быть не может:  $S_k(0) = 0$ , но ненулевой свободный член регулярно возникает при дифференцировании многочленов  $S_k$  (при  $k = 2, 4, \dots$ ). Однако с точностью до свободного члена гипотеза, как нетрудно проверить, для всех найденных многочленов выполняется.

**ГИПОТЕЗА 3'.**  $S'_k = kS_{k-1} + \text{const}$ .

На самом деле, это утверждение становится почти очевидным, если говорить не об отдельных многочленах, а об операторах, действующих на множестве многочленов.

Обозначим символом  $\Sigma$  «оператор суммирования», переводящий многочлен  $P$  в такой многочлен  $\Sigma[P]$ , что

$$(\Sigma[P])(n) = P(1) + P(2) + \dots + P(n).$$

Напомним (см. § 1), что он определяется двумя условиями<sup>1)</sup>:

$$(\Sigma[P])(0) = 0; \tag{*}$$

$$\Delta\Sigma[P] = P. \tag{**}$$

Таким образом, оператор суммирования  $\Sigma$  соотносится с оператором разностной производной  $\Delta$  примерно так же, как (определённый) интеграл соотносится с дифференцированием.

Наша гипотеза состояла в том, что  $D\Sigma[x^k] = \Sigma D[x^k] + \text{const}$ , где  $D$  — оператор дифференцирования.

**ЛЕММА 1.** *Операторы  $D$  и  $\Sigma$  «коммутируют с точностью до констант»:  $D\Sigma[P] - \Sigma D[P] = \text{const}$  (где константа своя для каждого многочлена  $P$ ).*

<sup>1)</sup> Напомним также, что  $(\Delta[P])(n) = P(n) - P(n-1)$ .

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Как отмечено выше,  $\Sigma$  — это почти обратная к  $\Delta$  операция. Но уже ясно, что оператор  $\Delta$  коммутирует с  $D$ . Действительно,

$$D\Delta[f] = [f(x) - f(x-1)]' = f'(x) - f'(x-1) = \Delta D[f].$$

Отсюда  $\Delta D\Sigma = D\Delta\Sigma = D$ , и из уравнения (\*\*\*) для  $P'$  получаем  $\Delta D\Sigma = \Sigma D$ , откуда следует утверждение леммы.  $\square$

В частности, взяв  $P(x) = x^k$ , мы получаем, что гипотеза 3' верна.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 1.  $S_k(x)' = kS_{k-1}(x) + B_k^*$  для некоторой константы  $B_k^*$ .

С помощью этого предложения можно, зная многочлен  $S_{k-1}$ , найти многочлен  $S_k$ : взять первообразную многочлена  $S_{k-1}$  с нулевым свободным членом, умножить на  $k$ , а потом прибавить  $B_k^*x$ , где константу  $B_k^*$  нужно выбрать из условия  $S_k(1) = 1$ .

Отсюда немедленно следует доказательство возникшей в упражнении 2 гипотезы о том, как меняются коэффициенты многочленов  $S_k$  при изменении  $k$ .

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 2. Коэффициент при  $n^{k+1-i}$  в многочлене  $S_k(n)$  имеет вид

$$B_i^* \cdot \frac{k(k-1)\dots(k+2-i)}{i!}.$$

Осталось объяснить, почему примерно половина этих коэффициентов обращается в нуль, другими словами, почему функция  $S_k(x) = \Sigma x^k$  является почти чётной/нечётной (в зависимости от чётности  $k$ ). Конечно, это связано просто с чётностью/нечётностью функции  $x^k$ .

Обозначим символом  $T$  оператор, переводящий функцию  $f(x)$  в функцию  $f(-x)$ . Функция  $f$  чётна, если  $Tf = f$ , и нечётна, если  $Tf = -f$ . Поэтому, чтобы выяснить, что происходит с чётной/нечётной функцией при применении оператора  $\Sigma$ , нужно выяснить, как связаны операторы  $\Sigma T$  и  $T\Sigma$ .

Как показывает доказательство леммы 1, для этого полезно выяснить, как связаны операторы  $T\Delta$  и  $\Delta T$ , т. е. сравнить выражения

$$T\Delta[P] = P(-x) - P(-x-1);$$

$$\Delta T[P] = P(-x) - P(-(x-1)) = -(P(-x+1) - P(-x)).$$

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 3. Если  $T[P] = \pm P$ , то соответственно

$$(\Sigma[P])(-x) = \mp(\Sigma[P])(x-1).$$

Доказательство (в духе доказательства леммы 1) оставляется читателю. Одно следствие полученного утверждения мы видели в упражнении 7:  $B_{2k+1}^* = 0$  при  $k \neq 0$ . Ещё одним следствием является следующая теорема Фаульхабера.

УПРАЖНЕНИЕ 8. Выведите из предложения 3, что

- $S_{2k-1}(n)$  является многочленом степени  $k$  от  $u := n(n+1)/2$ ;
- $S_{2k}(n)$  имеет вид  $(2n+1) \cdot$  (многочлен степени  $k$  от  $u$ ).

(Например,  $S_3(n) = u^2$ ,  $S_2(n) = (2n+1)u/6$ .)

## § 6. ЧИСЛА БЕРНУЛЛИ И СИМВОЛИЧЕСКИЕ МАНИПУЛЯЦИИ

Итак, мы получили формулу для сумм степеней:

$$S_k(n) = \frac{1}{k+1}n^{k+1} + \frac{1}{2}n^k + \dots + B_i^* \cdot \frac{k(k-1)\dots(k+2-i)}{i!} \cdot n^{k+1-i} + \dots + B_k^*n,$$

а коэффициенты  $B_k^*$  можно вычислять последовательно из соотношения  $S_k(1) = 1$ .

Эти коэффициенты — почти числа Бернулли  $B_k$ , а конкретнее  $B_1 = -B_1^*$ ,  $B_k = B_k^*$  при  $k > 1$ . Другими словами, числа Бернулли  $B_k$  играют роль, аналогичную числам  $B_k^*$  при суммировании степеней не до  $n^k$ , а до  $(n-1)^k$ :

$$S_k(n-1) = \frac{1}{k+1}n^{k+1} - \frac{1}{2}n^k + \dots + B_i \cdot \frac{k(k-1)\dots(k+2-i)}{i!} \cdot n^{k+1-i} + \dots + B_k n.$$

В таблице приведены несколько первых чисел Бернулли. Отметим, что дальше числа  $|B_{2n}|$  быстро растут (примерно как факториалы).

$n$	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
$B_n$	1	$-\frac{1}{2}$	$\frac{1}{6}$	0	$-\frac{1}{30}$	0	$\frac{1}{42}$	0	$-\frac{1}{30}$	0	$\frac{5}{66}$	0	$-\frac{691}{2730}$	0	$\frac{7}{6}$

Компактно записать (и запомнить) получающиеся формулы можно следующим образом. Заметим, во-первых, что

$$\frac{k(k-1)\dots(k+2-i)}{i!} = \frac{1}{k+1} \binom{k+1}{i},$$

поэтому

$$S_k(n-1) = \frac{1}{k+1} \left( n^{k+1} + (k+1)B_1n^k + \dots + \binom{n+1}{i} B_i n^{k+1-i} + \dots + (k+1)B_k n \right)$$

и получается выражение, напоминающее бином Ньютона. Чтобы сделать сходство более явным, будем писать у чисел Бернулли индекс не снизу, а сверху:

$$S_k(n-1) = \frac{1}{k+1} \left( n^{k+1} + (k+1)B^1 n^k + \dots + \binom{n+1-i}{i} B^i n^{k+1-i} + \dots + (k+1)B^k n \right).$$

Наконец, проигнорируем то, что в записи  $B^i$  число  $i$  является индексом, а не показателем степени, и запишем полученный нами ответ в следующем виде.

ТЕОРЕМА 3. 
$$S_k(n-1) = \frac{(B+n)^{k+1} - B^{k+1}}{k+1}.$$

Можно считать эту запись в духе *теневого исчисления*<sup>2)</sup> просто способом запомнить правильную формулу — получающуюся, если раскрыть скобки, а затем заменить  $i$ -ю степень формального символа  $B$  на  $i$ -е число Бернулли.

При  $n = 1$  получается компактная форма записи рекурренты для чисел Бернулли.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 4. 
$$(B+1)^{k+1} - B^{k+1} = 0 \quad (\text{при } k > 0).$$

Если в этой формуле раскрыть скобки, то  $B_{k+1}$  сократится и останется равенство, выражающее  $B_k$  через числа Бернулли с меньшими номерами:

$$B_k = - \sum_{i < k} \binom{k+1}{i} \frac{B_i}{k+1}.$$

УПРАЖНЕНИЕ 9. Докажите *формулу Эйлера — Маклорена* для многочленов: если многочлен  $F$  — первообразная многочлена  $f$ , то

$$f(0) + \dots + f(n-1) = F(B+n) - F(B) =: \int_0^n f(x+B) dx.$$

В заключение приведём ещё одну совсем уж загадочную манипуляцию с символом  $B$ . Подставим формально в последнее равенство  $f(n) = q^n$  (игнорируя тот факт, что это не многочлен). Получим ещё одно выражение для суммы геометрической прогрессии:

$$\frac{q^n - 1}{q - 1} = 1 + \dots + q^{n-1} = \frac{q^{B+n} - q^B}{\ln q} = \frac{q^n - 1}{\ln q} q^B,$$

откуда  $q^B = \frac{\ln q}{q - 1}$ . Чтобы избавиться от логарифма, сделаем замену  $q = e^s$ . Получим следующее равенство.

<sup>2)</sup> Кое-что о теневом исчислении можно узнать из гл. 5 книги [4].

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 5.  $e^{sB} = \frac{s}{e^s - 1}$ .

Понимать это следует как равенство формальных степенных рядов. А именно, экспонента  $e^t$  — это ряд

$$1 + t + \frac{t^2}{2!} + \frac{t^3}{3!} + \dots,$$

в правой части стоит результат деления (если угодно, «в столбик») двух рядов,

$$\frac{s}{s + \frac{1}{2}s^2 + \frac{1}{6}s^3 + \frac{1}{24}s^4 + \dots} = 1 - \frac{1}{2}s + \frac{1}{12}s^2 + 0 \cdot s^3 + \dots,$$

а в левой части — ряд

$$1 + B_1s + \frac{B_2}{2!}s^2 + \frac{B_3}{3!}s^3 + \dots,$$

и утверждается, что коэффициенты при всех степенях  $s$  в обеих частях равны.

УПРАЖНЕНИЕ 10. Докажите предложение 5: выведите из рекурренты для чисел Бернулли равенство формальных рядов

$$\left( \sum \frac{B_i}{i!} s^i \right) (e^s - 1) = s.$$

Обычно равенство из предложения 5, наоборот, считается *определением* чисел Бернулли, и в более стандартном (и, в определённом смысле, концептуально более правильном) способе получения формулы для  $S_k(n)$  и формулы Эйлера — Маклорена числа Бернулли сразу возникают именно как коэффициенты такого ряда (см., например, книгу [2]).

## § 7. ЗНАЧЕНИЯ ДЗЕТА-ФУНКЦИИ

Числа Бернулли возникают в разных задачах теории чисел, комбинаторики, алгебраической топологии... Здесь мы приведём (без доказательства) ещё только один пример — тоже связанный с вычислением некоторой суммы  $k$ -х степеней.

Напомним, что для  $s > 1$  *дзета-функция Римана*  $\zeta(s)$  определяется как сумма ряда

$$1 + \frac{1}{2^s} + \frac{1}{3^s} + \dots$$

Например, хорошо известно, что

$$1 + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \dots = \frac{\pi^2}{6}.$$

На самом деле, это частный случай следующего утверждения (элементарное доказательство можно найти в гл. 7 книги [1]).

ТЕОРЕМА 4.  $\zeta(2k) = (-1)^{k+1} \frac{(2\pi)^{2k}}{2(2k)!} B_{2k}$  для целых положительных  $k$ .

Кроме того, хотя бесконечные суммы  $1^k + 2^k + \dots$  очевидным образом расходятся, существует некоторый канонический способ аналитически продолжить функцию  $\zeta(s)$  на  $s < 1$ , и для  $s = -k$  получается совсем простая формула (ср. с формулой  $\frac{(B+n)^{k+1} - B_{k+1}}{k+1}$  для конечной суммы  $k$ -х степеней).

ТЕОРЕМА 5.  $\zeta(-k) = -\frac{B_{k+1}^*}{k+1}$  для целых неотрицательных  $k$ .

#### БЛАГОДАРНОСТИ

Автор благодарит А. И. Сгибнева за обсуждение различных тем, близких к задаче о сумме степеней, и за многочисленные замечания к предыдущим версиям текста, а также Г. Б. Шабата — и за полезные обсуждения, и за возможность поучаствовать в работе Клуба экспериментальной математики (всё это, несомненно, повлияло на данный текст).

#### СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- [1] Айгнер М., Циглер Г. Доказательства из Книги. Лучшие доказательства со времён Евклида до наших дней. М.: Бином, 2015.
- [2] Грэхем Р., Кнут Д., Паташник О. Конкретная математика. Основание информатики. М.: Мир, 1998.
- [3] Кушниренко А. Целые точки в многоугольниках и многогранниках // Квант. 1977. № 4. С. 13–20.
- [4] Ландо С. К. Введение в дискретную математику. М.: МЦНМО, 2014.
- [5] Beck M., Robins S. Computing the Continuous Discretely: Integer-point Enumeration in Polyhedra. New York: Springer, 2007.